

## INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANIQUE - SITE KI

nb accts (exclusion hors hôpital):	1805
dont IMG >= 22 SA:	4

**2016**

Tx césarienne total	.
Tx césarienne programmée	.
Tx césarienne non-programmée	.


**Activité c**

**2016**

Tx césarienne total	.
Tx césarienne programmée	.

## Evolution de l'activité de césarienne

### Césariennes totales



Votre étab.

T

Le

**Recommandation HAS 2012 :**

En raison de la morbidité néonatale (notamment d'être avant 39 semaines d'aménorrhée pour les grossesses non bénéfiques/risques de la césarienne programmée par ra

**Répartition par terme des cés**

Terme de l'accouchement	2016
< 37 SA	.
37 SA	.
38 SA	.
>= 39 SA	.
Total	0%

## Activité de l'année 2020

### Type 2A

nombre total de césariennes:

nombre de césariennes programmées

### Activité césarienne


Votre établissement				Evol.	Type 2A IDF
2017	2018	2019	2020	16-20	2020
21.4%	20.4%	19.6%	18.9%	.	22.2%
6.6%	7.2%	5.7%	5.4%	.	7%
14.8%	13.2%	13.9%	13.5%	.	14.2%

### Césarienne dans une pop. à bas risque

Votre établissement				Evol.	Type 2A IDF
2017	2018	2019	2020	16-20	2020
13.2%	11.9%	12.2%	12%	.	14.2%
0.3%	0.9%	0.8%	1.6%	.	1.6%

Comparaison de votre étab et dans les types 2A d'IDF et de Fr. métro.

### Césariennes dans pop. à bas risq



Type 2A IDF

Type 2A Fr

## es césariennes programmées

asse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne nonofoetales. Il est recommandé d'informer la patiente de la balance rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière.

### ariennes programmées pour les accouchements uniques

Votre établissement				Evol.	Type 2A IDF
2017	2018	2019	2020	16-20	2020
2.6%	2.1%	6.7%	6.2%	.	1.2%
10.3%	10.6%	11.4%	8.2%	.	4.5%
25.2%	27%	31.4%	28.9%	.	28.9%
61.9%	60.3%	50.5%	56.7%	.	63.5%
100%	100%	100%	100%		98.1%

920000643

341

98

Type 2A Fr

2020

20.4%

6.7%

13.4%


Type 2A Fr

2020

11.7%

2%

ue



2020



programmée  
e

Type 2A Fr
2020
1.9%
5%
31.1%
59.7%
97.7%

Légendes des groupes (HAS)

	A - <37 SA
	B - >=37 SA - mult
	C - >=37 SA - uniq
	D - >=37 SA - uniq
	E - >=37 SA - uniq
	F - >=37 SA - uniq
	G - >=37 SA - uniq

Comparaison de  
Votr

Taille relative  
(%)


A	4.9
B	0.3
C	3.3
D	8.3
E	10.7
F	40.3
G	32.2
	100

Comparaison des t:  
Votr

Taille relative  
(%)

A	4.9
B	0.3
C	3.3

D	8.3
E	10.7
F	40.3
G	32.2
	100





## Type 2A

### ement selon les situations cliniques (ref : HAS)

iple

ue - autre présentation que sommet

ue - présentation sommet - utérus cicatriciel

ue - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - diabète ou suspicion ma

ue - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion m

ue - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion n

### is taux de césarienne globale selon les groupes

re établissement 2020

Type 2A IDF 2020

Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)
34.1	1.7	4.4	37.5
50	0.1	0.4	68.3
72.9	2.4	3.4	82.9
56.7	4.7	9.8	68.2
17	1.8	9.5	17.4
17.1	6.9	33.1	20.5
4	1.3	38.5	5.9
	18.9	99.1	

### aux de césarienne programmée selon les groupes

re établissement 2020

Type 2A IDF 2020

Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)
6.8	0.3	4.4	4.3
16.7	0.1	0.4	32.2
42.4	1.4	3.4	44.5

38.7	3.2	9.8	47
0.5	0.1	9.5	2.6
1	0.4	33.1	1
0	0	38.5	0.6
5.5		99.1	

ne programmée




Votre établissement



Type 2A IDF



Type 2A FR



920000643

chromosome

macrochromosome - multi

macrochromosome - prim

---

Contribution au taux (%)
1.6
0.3
2.8
6.7
1.7
6.8
2.3
22.2

---

---

Contribution au taux (%)
0.2
0.1
1.5

4.6
0.2
0.3
0.2
<hr/>
7.1
<hr/>

4.7 %

rosomie  
es



Légendes des groupes (Robson)

	G1 et G2 - Singleton, primipares
	G3 et G4 - Singleton, multipares
	G5 - Singleton, second ou troisième accouchement
	G6 et G7 - Singleton, quatrième ou cinquième accouchement
	G8 - Toutes les grossesses multiples
	G9 - Toutes les autres grossesses multiples
	G10 - Toutes les sages-femmes

Comparaison de la taille relative des groupes

Votre


	Taille relative (%)
G1 et G2	45.2
G3 et G4	38.1
G5	8.3
G6 et G7	3.3
G8	0.7
G9	0.3
G10	4.2
	100.1

Comparaison des tailles relatives des groupes

Votre

	Taille relative (%)
G1 et G2	45.2
G3 et G4	38.1
G5	8.3

G6 et G7	3.3
G8	0.7
G9	0.3
G10	4.2
	100.1



## Type 2A

### ement selon les situations cliniques (ref : Robson)

on, sommet,  $\geq 37$  SA, sans ATCD de césarienne - primipare

on, sommet,  $\geq 37$  SA, sans ATCD de césarienne - multipare

mmet,  $\geq 37$  SA, avec ATCD de césarienne

on, siège

rossesses multiples

tres présentation (hors siège et sommet)

ingletons, sommet,  $< 37$  SA

### is taux de césarienne globale selon les groupes

re établissement 2020

Type 2A IDF 2020

Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)
18.4	8.3	36.9	21.2
4.4	1.7	43	6.2
56.7	4.7	9.8	68.2
71.2	2.3	3.3	83.7
66.7	0.5	0.8	66.7
80	0.2	0.5	75
28.9	1.2	3.8	30.9
	18.9	98.1	

### aux de césarienne programmée selon les groupes

re établissement 2020

Type 2A IDF 2020

Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)
1.6	0.7	36.9	1.6
0	0	43	0.8
38.7	3.2	9.8	47

42.4	1.4	3.3	47.8
8.3	0.1	0.8	25
20	0.1	0.5	6.2
6.6	0.3	3.8	2.5
5.8		98.1	

ne programmée




Votre établissement



Type 2A IDF



Type 2A FR





---

Contribution au taux (%)
7.8
2.7
6.7
2.8
0.5
0.4
1.2
22.1


---

---

Contribution au taux (%)
0.6
0.3
4.6

$$\begin{array}{r}
 1.6 \\
 0.2 \\
 0 \\
 0.1 \\
 \hline
 7.4 \\
 \hline
 \end{array}$$

28.3 %



1

