

Lien ville-hôpital pour l'organisation de l'évaluation du risque d'une grossesse permettant d'orienter le lieu de suivi/ accouchement de la grossesse



Jacky Nizard
GH Pitié Salpêtrière

Légitimité

- Communauté périnatale de Poissy et sa région
- Réseau ville-hôpital Pitié Salpêtrière
- HAD obstétrique de l'APHP
- Maternité qui reçoit la médecine maternelle

**Nos populations changent plus vite
que nos mentalit s.**

41% en 2014

- **Niveau de risque**
- **Décroissance thérapeutique pour le bas risque**
- **« Triage » plus précoce et de meilleure qualité de la pathologie**
- **Anticiper un avenir logique**

- **« je suis enceinte » !**
- **Je démarre et organise mon suivi**
- **Capacité permanente à adapter le suivi jusque dans le postpartum**

- « je suis enceinte » !

= **BRAVO**, on lance le bilan et on vous organise le premier RDV à la maternité

= **professionnel de proximité : SFL, médecin de ville**


Sauf évidence →→→ maternité de proximité pour premier contact

- Je démarre et organise mon suivi



- **Exemple local**

**Etablissement
privé**



CHU standard

CHU spécifique



**Même entre CHU, il y a des
spécificités**

**On ne fait bien que ce que
l'on fait tout le temps**

**Même entre CHU, il y a des
spécificités**

**On ne fait bien que ce que
l'on fait tout le temps**

**= meilleures issues pour
les mères et pour les
enfants**

- **« je suis enceinte » !**
- **Je démarre et organise mon suivi**
- **Capacité permanente à adapter le suivi jusque dans le postpartum**



**Mais pourquoi par tout le suivi en ville
puis en maternité à partir du 7-8^e
mois ?**

**Mais pourquoi par tout le suivi en ville
puis en maternité à partir du 7-8^e
mois ?**

TROP DE RATES



Les professionnels de ville sont-ils confinés au bas-risque ?

**Les professionnels de ville sont-ils
confin s au bas-risque ?**

NON

- **Avant**
- **Pendant**
- **Apr s**

- **Avant**
- **Pendant**
- **Apr es**

- **Paradoxe de la grossesse pathologique :
besoin encore plus important du suivi par SF
lib erale**

- **Avant**
- **Pendant**
- **Après**

- **Paradoxe de la grossesse pathologique :
besoin encore plus important du suivi par SF
libérale**

- **Tester des modèles**

Hypoth se :

Si le chemin est bien balis  (*protocoles de suivi*) et les contacts faciles, le suivi de plus de la moiti  des grossesses pathologiques pourrait se faire  galement en ville.

TRAVAIL ORIGINAL

Étude de la faisabilité et de la valorisation de l'échographie focalisée dans un cadre d'explorations fonctionnelles extra-hospitalières pour des grossesses à risque

Evaluation of the feasibility of ultrasound in a community care outpatient pregnancy assessment clinic for high-risk pregnancies

N. Bil^a, V. Eggermann^b, A. Roueli^b, J. Nizard^{c,*}



Indications des explorations fonctionnelles (N = 429)




Figure 1 Volume d'activité aux explorations fonctionnelle en fonction du nombre de consultations.




Figure 3 Activité aux explorations fonctionnelles réalisée dans l'indication « diabète » rapportée à la totalité des consultations.




Figure 3 Activité aux explorations fonctionnelles réalisée dans l'indication « diabète » rapportée à la totalité des consultations.




Figure 7 Activité aux explorations fonctionnelles réalisée dans l'indication « surveillance de fin de grossesse », à partir de 41 SA, rapportée à la totalité des consultations.





Figure 9 Actes réalisés aux explorations fonctionnelles.



Demain...

Le bas-risque ne viendra dans la maternit e
que pour :

- Triage et ouverture de dossier
- Certaines consultations (anesth siste, visite, fin de grossesse)
- Rentrera vite dans son r seau de ville

Demain...

Nous ne verrons plus :

- Les patientes avec un IMC ≥ 52 adress es   36SA apr s la consultation d'anesth sie
- Les cardiopathies connues transf r es   35SA pour mauvaise tol rance
- Les thrombose de valves cardiaque m caniques pour anticoagulation insuffisante...



TEAM
WORK